

Stand 15.05.2020

| Studienart | Studie | Kurzbeschreibung | Status |
|--------------------------------------|--|--|---|
| <i>Registerstudien</i> | BreastCancerPregnancy | Prospektive Registerstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft. | offen zur Rekrutierung |
| <i>Registerstudien</i> | Brainmet | Prospektive und Retrospektive Registerstudie von Patientinnen mit Hirnmetastasen bei Brustkrebs. | offen zur Rekrutierung |
| <i>Registerstudien</i> | Score | Identifikation von Faktoren zur Ermittlung eines Scores für die Vorhersage der Non-Compliance in der Routinetherapie des rezidivierenden Ovarialkarzinoms mit Ovastat (Treosulfan). Keine weiteren Ein- oder Ausschlusskriterien. | offen zur Rekrutierung |
| <i>Registerstudien</i> | Carolin meets Hanna / Expression VI Ovar | Weltweite Umfrage von langzeitüberlebenden Patientinnen mit Eierstock-, Eileiter- oder Bauchfellkrebs via Internet oder Papier | offen zur Rekrutierung |
| <i>Registerstudien</i> | Ribanna | Eine nicht interventionelle Studie für postmenopausale Frauen mit einem HR+/Her2- lokal fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität des Behandlungsalgorithmus, beginnend mit Ribociclib in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder mit einer endokrinen Therapie oder mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie in der klinischen Routine. | offen zur Rekrutierung |
| <i>Chirurgische Studien</i> | INSEMA | Vergleich der axillären Sentinel-Lymphknotenbiopsie versus keiner Axilla-Operation bei Patientinnen mit invasiven Mammakarzinom (Stadium I und II) und brusterhaltender Therapie: Eine prospektiv-randomisierte, operative Studie. | Studie in der Nachbeobachtungsphase (Follow UP) |
| <i>Palliative Studie</i> | DETECT V | Eine multizentrische, randomisierte Phase III-Studie zum Vergleich einer Chemo versus einer endokrinen Therapie in Kombination mit einer dualen HER2-gerichteten Herceptin® (Trastuzumab)/ Perjeta® (Pertuzumab)-Therapie bei Patientinnen mit HER2-positivem und hormonrezeptorpositivem metastasiertem Brustkrebs. | offen zur Rekrutierung |
| <i>Nicht-interventionelle Studie</i> | Otilia (NIS) | Eine nicht-interventionelle Studie, dient der Erfassung von Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Avastin (Angiogenesehemmer Bevacizumab). Unter Studienbedingungen wird Avastin mit einer Chemotherapie kombiniert. Neu diagnostizierter fortgeschrittener Eierstocks- bzw. Eileiterkrebs nachgewiesene Peritonealcarcinose. | Studie in der Nachbeobachtungsphase (Follow UP) |

Stand 15.05.2020

| Studienart | Studie | Kurzbeschreibung | Status |
|--------------------------------|----------|---|---|
| <i>Registerstudien</i> | SenTa | Prospektive, multizentrische, Registerstudie zur Anwendungshäufigkeit und Durchführbarkeit einer gezielten, axillären Lymphknoten-Exzision (Targeted Axillary Dissection) nach Stanzbiopsie und Clipmarkierung beim primären Mammakarzinom mit klinisch suspekten Lymphknoten. Pat. geplant zur NACT wie auch primär zu operierende Patientinnen | Studie in der Nachbeobachtungsphase (Follow UP) |
| <i>Interventionelle Studie</i> | Tamendox | Prospektive, multizentrische, interventionelle, einfach verblindete, pharmakogenetische, pharmakokinetische Mehrfachdosis-Studie mit drei Studienarmen. (https://www.gbg.de/de/studien/tamendox.php) Genotyp- und phänotypbasierte Supplementierung einer Standard-TAMoxifentherapie mit dem aktiven Metaboliten ENDOXifen bei Brustkrebs-Patientinnen. (https://www.gbg.de/de/studien/tamendox.php) | offen zur Rekrutierung |